

Дифлайн, КЭ



960 г/л С-метолахлора

5 л, 20 л,
1000 л



Срок годности 3 года
от -15 до +35 °С

**Довсходовый гербицид для защиты
сахарной свеклы, подсолнечника,
кукурузы, сои и рапса**



- ◆ Высокоэффективен против широкого спектра однолетних злаковых и двудольных сорняков
- ◆ Устраняет конкуренцию с сорными растениями в начальный период роста
- ◆ Не оказывает фитотоксичного воздействия на культуру и не имеет последствий
- ◆ Обеспечивает продолжительный период защитного действия от 8 до 10 недель

Механизм действия

Гербицид Дифилайн блокирует процесс деления клеток, что ведёт к прекращению отрастания и гибели сорняков. В злаковых сорняках С-метолахлор проникает в coleoptyle, в процессе чего росток скручивается и гибнет. В двудольных действующее вещество проникает в семядоли и вызывает их гибель.

Спектр действия

Куриное просо, просо волосовидное, щетинник (виды), росичка (виды), гүмай (проростки), щирица (виды), звездчатка средняя, пастушья сумка, портулак огородный, ромашка (виды), галинсога (виды), яснотка (виды) и многие другие.

Скорость действия

Препарат контролирует сорняки в момент прорастания.

Период защитного действия

Почвенное действие препарата на прорастающие сорняки сохраняется 8–10 недель.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Применять препарат рекомендуется в течение первых трёх дней после посева культуры. Достаточная увлажненность почвы — одно из условий оптимального поглощения. Если наблюдается недостаток почвенной влаги, после применения гербицида рекомендуется провести прикатывание почвы.

При сухой почве рекомендуется проведение опрыскивания гербицидом перед высевом семян и лёгкая заделка на глубину 2–3 см. Норма расхода препарата зависит от типа почвы, уровня и видового состава сорняков. На почвах лёгкого механического состава, с невысоким содержанием гумуса рекомендуется использовать минимальные дозы.

Максимальный гербицидный эффект достигается при хорошей выровненности поверхности поля, мелкокомковатой структуре почвы и отсутствию растительных остатков. Для расширения спектра действия рекомендуется баковая смесь с гербицидами Алгоритм или Акцифор.

На рапсе при наличии мари белой, амброзии и подмаренника цепкого: Дифилайн 1,0 л/га + Алгоритм 0,12–0,15 л/га.

На сое при наличии мари белой и амброзии: Дифилайн 1,0 л/га + Алгоритм 0,2–0,4 л/га.

На подсолнечнике при наличии щирицы и злаковых сорняков: Дифилайн 1,0 л/га + Акцифор 0,6 л/га.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Кукуруза, соя, подсолнечник, рапс яровой	1,3–1,6	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см). Расход рабочей жидкости — 200–400 л/га.
Свёкла сахарная	1,3–2		