

Клорит, ВР*



300 г/л клопиралида



Срок годности 3 года
от 0 до +30 °C

**Незаменимый гербицид
для борьбы с трудноискоренимыми
и злостными сорняками в посевах
сельскохозяйственных культур**



- ◆ Работает против злостных сорняков в посевах с/х культур (виды осота, бодяка, латука, горца, ромашки и др.)
- ◆ Уничтожает как надземную, так и подземную часть сорных растений
- ◆ Обладает высокой селективностью к защищаемым культурам
- ◆ Прекрасный партнёр баковых смесей

*подробное описание препарата
можно найти на www.fmrus.ru

Механизм действия

Системный гербицид ауксинового типа. Клопиралид поглощается всеми органами растения, перемещается по нему и накапливается в точках роста, нарушая деление клеток. Сорняки прекращают рост через несколько часов после обработки.

Спектр действия

Виды осота, бодяка, латука, ромашки, горца, гречишка выюнковая, одуванчик, щавель, подорожник, тысячелистник и другие двудольные сорняки.

Скорость действия

Признаки увядания сорных растений (деформация, скручивание, утолщение стеблей и листьев) наблюдаются на 4–5 день; хлороз, отмирание точки роста и затем гибель сорняков — через 10–15 дней.

Период защитного действия

Действует только на сорняки, находившиеся в посевах в момент проведения обработки. На сорняки, возшедшие после проведения опрыскивания, препарат не действует.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости

к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Оптимальная температура для применения препарата от +10 °С до +25 °С. Обработку следует проводить по активно вегетирующим сорнякам: 2–10 листьев у однолетних и 10–15 см («розетка») у многолетних корнеотпрысковых сорняков. В зависимости от видового состава сорняков на сахарной свёкле рекомендуется применять баковые смеси со следующими гербицидами: Вымпел 2, Вымпел 3, Флуорон, Галлон. Не рекомендуется применять препарат за 3 дня до и после заморозков.

Не применять в условиях, когда культура находится в стрессовом состоянии (по причине засухи, при сильном поражении болезнями и повреждении вредителями). Препарат не оказывает влияния на последующие культуры севооборота.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с щелочной или кислой реакцией.

Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница озимая и яровая, ячмень	0,16–0,5	Виды ромашки, горца гречишка выюнковая, виды бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе кущения — до выхода в трубку культуры. Озимые культуры обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га.
Свекла сахарная	0,3–0,5		Опрыскивание посевов в фазе 1–3 пары настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га.
Кукуруза	0,5–1	Виды ромашки, горца, гречишка выюнковая, виды бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3–5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га.
Рапс яровой (семенные посевы)	0,3–0,4	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание в фазе 3–4 настоящих листьев рапса ярового. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га.
Земляника	0,5–0,6	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и однолетние двудольные (виды ромашки, горца)	Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га.

Применение в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ)

Газоны	1,5 мл/5 л воды (л)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Расход рабочей жидкости 5л/100 м².
	6,0 мл/5 л воды (л)	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка)	
Земляника	3,0 мл/3 л воды (л)	Многолетние двудольные сорняки (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (виды ромашки, горца)	Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости 3 л/50 м².